

FORMAS

+
Gotas Concentradas Para Bebés (Infants' Concentrated Drops)

+
Suspensión Líquido y Elixir Para Niños (Children's Suspension Liquid & Elixir)

+
Tabletas Masticables Para Niños (Children's Chewable Tablets)

+
Tabletas/Cápsulas Dosis para Niños Mayores (Junior Strength Tablets/Caplets)

+
Dosis para Adultos

Dosis Apropriadas De Acetaminofén Para Niños

Guía para padres de familia



Escoja el producto correcto



Direcciones: Jale la lengüeta hasta que el punto este en el producto que quiere a la izquierda, vea el producto en la ventana.



Carolinas Poison Center
Centro de Envenenamiento de las Carolinas

1-800-222-1222

PESO/EDAD DEL NIÑO

+
3 - 5 kilos
6 - 11 libras
0 - 3 meses

+
5.5 - 8 kilos
12 - 17 libras
4 - 11 meses

+
8 - 10.5 kilos
18 - 23 libras
12 - 23 meses

+
11 - 16 kilos
24 - 35 libras
2 - 3 años

+
16.5 - 21 kilos
36 - 47 libras
4 - 5 años

+
22 - 26 kilos
48 - 59 libras
6 - 8 años

+
27 - 32 kilos
60 - 71 libras
9 - 10 años

+
33 - 43 kilos
72 - 95 libras
11 años

Consejos para Dar la Medicina Correctamente....

- **Sepa el peso de su niño/a.** Las dosis de las medicinas son generalmente de acuerdo al peso o edad del niño/a. Recuerde que la dosis cambia cuando su hijo/a crece.
- **Siga las instrucciones.** Dé la dosis indicada para su niño basada en su peso y edad.
- **Siempre use el instrumento de medir incluido en la medicina.** Nunca use otros goteros, cucharas o tazas.
- **Apunte la hora y la cantidad de cada dosis dada para evitar una sobredosis accidental.**
- **Nunca use medicina de potencia para adultos en niños menores de 12 años.**
- **El acetaminofén se da cada 4 a 6 horas con un máximo de 5 dosis en 24 horas.**

Direcciones: Jale la lengüeta hasta que el punto este alineado con el peso/edad de su hijo/a. La dosis correcta de la medicina va a estar en la caja de abajo.

Tabla de Dosis

Dele solo **uno** de los siguientes productos

Gotas Concentradas Para Bebés (Infants' Concentrated Drops) 80 mg/0.8 ml* Gotero lleno	Suspensión Líquido y Elixir Para Niños (Children's Suspension Liquid & Elixir) 160 mg/5ml* Cucharadita	Tabletas Masticables Para Niños (Children's Chewable Tablets) 80 mg cada una Tableta	Tabletas/Cápsulas Dosis para Niños Mayores (Junior Strength Tablets/Caplets) 160 mg cada una Tableta/Cápsula
---	--	---	--



*1ml=1mL=1cc

Estos son productos que se disuelven rápidamente en la boca. Tienen la misma concentración que las pastillas que pueden ser masticadas o tragadas y se dan en las mismas dosis.

816-SLS Front



Dosis para Adultos Tabletas/Cápsulas 325mg o 500 mg cada una (Adult Strength Tablets/Caplets 325 mg or 500 mg each)



Dosis para Niños Mayores Tabletas/Cápsulas 160 mg cada una (Junior Strength Tablets/Caplets 160 mg each)



Tabletas Masticables Para Niños 80 mg cada una (Children's Chewable Tablets 80 mg each)



Suspensión Líquido y Elixir Para Niños 160 mg/5 ml (Children's Suspension Liquid & Elixir 160 mg/5ml)



Gotas Concentradas Para Bebés 80 mg/0.8 ml (Infants' Concentrated Drops 80 mg/0.8 ml)

Cuando el acetaminofén es usado apropiadamente, controla la fiebre y el dolor. Pero si le da mucho acetaminofén a un niño puede ocasionar sobredosis. Es muy importante dar a su hijo/a la dosis correcta, la concentración correcta y el producto correcto. Use el peso de su hijo/a para asegurarse que tiene la dosis apropiada. Voltee este folleto para las instrucciones de dosis de acetaminofén.

X	3 cucharaditas	6 tabletas	3 tabletas/ cápsulas
X	2 1/2 cucharaditas	5 tabletas	2 1/2 tabletas/ cápsulas
X	2 cucharaditas	4 tabletas	2 tabletas/ cápsulas
X	1 1/2 cucharaditas	3 tabletas	X
2 goteros llenos= (0.8+0.8ml)	1 cucharadita	2 tabletas	X
1 1/2 goteros llenos= (0.8+0.4ml)	3/4 cucharadita	X	X
1 gotero lleno = (0.8ml)	1/2 cucharadita	X	X
1/2 gotero = (0.4ml)	X	X	X

© Positive Promotions Printed in U.S.A. 816-SLS

Para niños de más de 96 libras y 12 años de edad o mayores, se pueden suministrar 4 Tabletas/Cápsulas de Dosis para Niños Mayores (160 mg cada una) (Junior Strength Tablets/Caplets 160 mg each). Además, usted puede guiarse por las instrucciones de dosis para adultos de acetaminofén.